

Gewichtsverlust | Muskelabbau | Kraftverlust Hypalbuminämie | Inflammation

Bei ICD10 E43, ICD10 R64, allgemein für Patienten mit drohender oder bestehender Mangelernährung sowie bei Störungen der Nahrungsaufnahme:

restoric® supportiv S



Hohe Energie- und hohe Eiweißzufuhr

- Vollständig balanziert
- Hochkalorisch (316 kcal/Portion)
- Eiweißreich (20 g/Portion)
- FODMAP*-arm
- Mit leicht verdaulichen MCT-Fetten
- Glutenfrei
- Laktosearm

Sorten restoric® supportiv S VPE: 30 x 70 g (zzgl. 1 Schüttelbecher)	PZN
Schokolade	18354247
Vanille	18354230
Erdbeere	18354141
Neutral	18354158
Mischkarton	18354224

Dosierung: i.d.R. 1–3 Beutel/Tag

restoric® supportiv S Vegan

bei Milchallergie oder Milchaversion



Hohe Energie- und hohe Eiweißzufuhr

- Vollständig balanziert
- Hochkalorisch (301 kcal/Portion)
- Eiweißreich (15 g/Portion)
- FODMAP*-arm
- Mit leicht verdaulichen MCT-Fetten
- Gluten- und laktosefrei

Sorte restoric® supportiv S Vegan VPE: 30 x 65 g (zzgl. 1 Schüttelbecher)	PZN
Vegan	18354170

Dosierung: i.d.R. 1–3 Beutel/Tag

restoric® drink 2.0 kcal



Hohe Energie- und ausgeglichene Eiweißzufuhr

- Vollständig balanziert
- Hochkalorisch (400 kcal/Portion)
- Eiweißadaptiert (18 g/Portion)
- Mit Omega-3-Fettsäuren
- Mit leicht verdaulichen MCT-Fetten
- Glutenfrei
- Laktosefrei (< 0,1 g/100 ml)

Sorten restoric® drink 2.0 kcal VPE: 24 x 200 ml	PZN
Schokolade	16821259
Kirsche	16821265

Dosierung: i.d.R. 1–3 Flaschen/Tag

* FODMAP = fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols/
fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Polyole

Anspruch von Patienten mit erkrankungsbedingtem Gewichtsverlust auf Verordnung von medizinischer Trinknahrung auf Kassenrezept ist nach § 31⁵ SGB V gesetzlich geregelt¹

So einfach ist die Verordnung von restoric®-Trinknahrungen

Welche Patienten können restoric®-Trinknahrungen auf Kassenrezept erhalten?	• Alle Patienten mit drohender oder bestehender Mangelernährung
Wie wird eine Mangelernährung festgestellt?	• Eingeschränkte Fähigkeit zur Nahrungsaufnahme • oder Nahrungskarenz • oder unbeabsichtigter Gewichtsverlust > 5–10 % in den vergangenen 3–6 Monaten • oder BMI < 20
Welche Laborparameter weisen auf Kachexie hin?	• Serumalbumin < 35 g/l und/oder • Erhöhte Entzündungsparameter CRP > 5 mg/l; IL-6 > 4 pg/ml
Was ist zu dokumentieren?	• Neben der Grunderkrankung ist die Diagnose der Malnutrition zu dokumentieren, z. B.: ICD-10 E 43 (... erhebliche Energie- und Eiweiß- Mangelernährung); ICD-10 R 64 (Kachexie)
Muss von der Arztpraxis eine Genehmigung bei der Krankenkasse eingeholt werden?	• Nein. Medizinische Trinknahrungen (bilanzierte Diäten) sind Arzneimitteln gleichgestellt. ²
Wie lange kann restoric® verordnet werden?	• So lange, bis der Patient den gewünschten Ernährungszustand erreicht hat, bzw. sich wieder selbst ausreichend normal ernähren kann – und sich das Gewicht und der Albuminwert stabilisiert haben.
Was muss auf das Rezept geschrieben werden?	• Menge, Produktbezeichnung, Pharmazentralnummer
Welche restoric®-Trinknahrung ist nötig, um neue Muskelkraft und Energie aufzubauen?	• Für jede Behandlungssituation die passende restoric®-Trinknahrung – siehe Vorderseite

¹ § 31 (5) SGB V: www.sgbv.de. ² Bundesmantelvertrag Ärzte (BMV-Ä) § 29 Verordnung von Arzneimitteln: www.bmv-aerzte.pdf (kbv.de)